Forceps-Abbildungen europäischer Melolonthiden nach Präparaten von Metzler in Frankfurt a. M.

von H. Tieffenbach.

(Dazu Tafel IV.)

Nachfolgend ist die Abbildung und Aufzählung der Präparate europäischer Melolontha-Penis gegeben, welche H. Metzler in Frankfurt hinterlassen hat; Fig. 37—42 auch im Profil, Fig. 25—36, 43, 45 nur im Profil. Es wird in den nachfolgenden Arbeiten auf diese Figuren Bezug genommen werden.

Erklärung der auf Tafel IV. gegebenen Abbildungen.

1.	Hoplia; farinosa L. Eur. mer.	25. Polyphylla fullo L. Germ.
	l squamosa F.	26 alba Pall. Ross. mer.
2.	- coerulea Drury Gall.	27 Ragusae Kraatz Sicil.
3.	Hymenoplia Chevrolati Muls. Gall.	28 Olivieri Lap. Caucas.
	Triodonta aquila Lap. Gall.	29 Boryi Brullé Graec.
5.	Homaloplia ruricola F. Germ.	30. Anoxia orientalis Kryn. Graec.
6.	Serica brunnea L. Germ.	31 emarginata Coq. Barb.
7.	Haplidia transversa F. Dalm.	32 matutinalis Lap. Gall. m.
8.	Lasiopsis Henningii Fisch. R. m.	33 villosa F. Germ. mer.
9.	Monotropus Staudingeri Schf. And.	34 pilosa F. Germ. mer.
10.	Lachnost. castanea Waterh. Amur	35 scutellaris Muls. Gall. m.
11.	Trematod. tenebrioides Pall. Ross.m.	36 sicula Motsch. Sicil.
12.	Pseudotrematodes Frivaldskyi Mén.	37. Melolontha vulgaris F. Germ.
	Graec.	38 hippocastani F. Germ.
13.	Rhizotrogus solstitialis L. Germ.b.	39 \ albida Friv.
14.		candicans Burm. Syria
15.		40 albida Muls. Graec.
16.	- Pini Ol. Pyr.	41 papposa Illig. Andalus.
17.	- nomadicus Reiche Portug-	42 hybrida Charp. Hisp. centr.
18.	- Arianae Fairm. Naxos	43, - Rhenana Bach Rheinld.
19.	- caucasicus Gyll. Cauc.	44 hybrida Charp. (Profil.)
20.	1 1	45 praeambula Kol. Cauc.
21.	- pulvereus Knoch. Ross. m	46. Tanyproctus Kindermanni Reiche.
22.	Geotrogus sicelis Blanch. Sicil.	47. Pachydema Reichii Ramb. Graec.
23.	- dispar Blanch. Algier	48. Elaphocera Bedeaui Er. Andalus.
24.	- sinuatocollis Fairm. Algier	